


# CHLAMYDIA

*Chlamydia is a common sexually transmitted infection that can affect people of all genders. Chlamydia is often characterized by genital discharge and burning sensation when peeing. If untreated, it can cause permanent damage to the cervix, uterus, and ovaries.*

## SYMPTOMS:


### If you have a Vagina:

- Burning sensation when peeing.
- Abnormal yellowish or bloody vaginal discharge.
- Bleeding between periods.
- Belly pain and fever.




### If you have a Penis:

- Burning sensation when peeing.
- Penis discharge, usually yellow, white or green.
- Swelling and/or pain of testicles.




### Anal infection:

- Rectal pain or discharge
- Rectal bleeding
- Pain when pooping



### Throat infection:

- Sore throat.
- Redness and swelling.
- Sores in mouth or throat.




**HAVE SYMPTOMS OR A POTENTIAL EXPOSURE? GET TESTED TODAY! YOUR PROVIDER MAY ASK YOU TO GIVE A URINE SAMPLE OR COLLECT SWABS DEPENDING ON TYPE OF SEXUAL EXPOSURE AND SYMPTOMS.**




# CHLAMYDIA

*Chlamydia is a common sexually transmitted infection that can affect people of all genders. Chlamydia is often characterized by genital discharge and burning sensation when peeing. If untreated, it can cause permanent damage to the cervix, uterus, and ovaries.*

## PREVENTION TIPS!



USE A CONDOM EVERY TIME YOU HAVE SEX.




GET TESTED REGULARLY AND BETWEEN NEW PARTNERS. COMMUNICATE ABOUT TESTING STATUS WITH PARTNERS.



ASK YOUR DOCTOR ABOUT DOXYPEP! A PILL TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF GETTING A STI POST EXPOSURE.

## CURABLE WITH ANTIBIOTICS!

You should wait 7 days after single oral dose treatment or until the end of a 7 day treatment before engaging in sex again.



*For more information or to find a testing location near you visit :*

<https://gettested.cdc.gov/>




# CLAMIDIA

*La clamidia es una infección de transmisión sexual prevalente que puede afectar a individuos de todos los géneros. Se manifiesta a través de secreción genital y sensación de ardor al orinar. Si no se aborda adecuadamente, puede provocar daños permanentes en el cuello uterino, el útero y los ovarios.*

## SÍNTOMAS:


### Si posees vagina:

- Sensación de escozor al orinar.
- Secreción vaginal anormal de tonalidad amarillenta o sanguinolenta.
- Sangrado intermenstrual.
- Dolor abdominal y fiebre.




### Si posees un pene:

- Sensación de escozor al orinar.
- Secreción del pene, generalmente de color amarillo, blanco o verde.
- Hinchazón y/o dolor en los testículos.




### Infección anal:

- Dolor o secreción anal
- sangrado rectal
- Dolor durante la defecación



### Infección faríngea:

- Dolor de garganta.
- Eritema e inflamación.
- Llagas en la cavidad bucal o la faringe.




**¿PRESENTA SÍNTOMAS O HA ESTADO EXPUESTO? ¡REALÍCESE LA PRUEBA HOY MISMO! SU MEDICO PODRÍA SOLICITARLE UNA MUESTRA DE ORINA O UN HISOPO, DEPENDIENDO DEL TIPO DE EXPOSICIÓN SEXUAL Y LOS SÍNTOMAS.**




# CLAMIDIA

*La clamidia es una infección de transmisión sexual prevalente que puede afectar a individuos de todos los géneros. Se manifiesta a través de secreción genital y sensación de ardor al orinar. Si no se aborda adecuadamente, puede provocar daños permanentes en el cuello uterino, el útero y los ovarios.*

## ¡RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN!



UTILICE UN PRESERVATIVO EN CADA OCASIÓN QUE TENGAS RELACIONES SEXUALES.




REALICE LA PRUEBA AL MENOS UNA VEZ AL AÑO Y MANTENGA COMUNICACIÓN CON SUS PAREJAS.



¡CONSULTE A SU MÉDICO ACERCA DE DOXYPEP! UN MEDICAMENTO PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE CONTRAER UNA ETS TRAS LA EXPOSICIÓN.

## ¡SE TRATA CON ANTIBIÓTICOS!

Debe esperar 7 días tras el tratamiento de dosis única o hasta completar un tratamiento de 7 días antes de reanudar las relaciones sexuales.



*Para obtener más información o localizar un centro de pruebas cercano, visite:*

<https://gettested.cdc.gov/>




# CLAMÍDIA

*A clamídia é uma infecção sexualmente transmissível prevalente que pode afetar indivíduos de todos os gêneros. Esta condição frequentemente se manifesta por meio de corrimento genital e uma sensação de queimação ao urinar. Se não for tratada, pode resultar em danos permanentes ao colo do útero, ao útero e aos ovários.*

## SINTOMAS:

### Se possui uma vagina:

- Sensação de ardor ao urinar.
- Secreção vaginal anormal amarelada ou sanguinolenta.
- Sangramento intermenstrual.
- Dor abdominal e febre.




### Se possui um pênis:

- Sensação de ardor ao urinar.
- Secreção peniana, muitas vezes de cor amarela, branca ou verde.
- Inchaço e/ou dor nos testículos.




### Infecção anal:

- Dor ou secreção anal
- Sangramento retal.
- Dor ao evacuar.



### Infecção da garganta:

- Dor de garganta.
- Eritema e edema.
- Feridas na cavidade oral ou na garganta.




**APRESENTA SINTOMAS OU UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO? REALIZE O TESTE AINDA HOJE! O SEU MÉDICO PODE SOLICITAR UMA AMOSTRA DE URINA OU A RECOLHA DE AMOSTRAS, CONSOANTE O TIPO DE EXPOSIÇÃO SEXUAL E OS SINTOMAS.**




# CLAMÍDIA

*A clamídia é uma infecção sexualmente transmissível prevalente que pode afetar indivíduos de todos os gêneros. Esta condição frequentemente se manifesta por meio de corrimento genital e uma sensação de queimação ao urinar. Se não for tratada, pode resultar em danos permanentes ao colo do útero, ao útero e aos ovários.*

## DICAS DE PREVENÇÃO.



UTILIZE SEMPRE PRESERVATIVO DURANTE A RELAÇÃO SEXUAL.




REALIZE O TESTE PELO MENOS UMA VEZ POR ANO E MANTENHA COMUNICAÇÃO COM OS PARCEIROS.



CONSULTE O SEU MÉDICO SOBRE A DOXIEP! UM COMPRIMIDO DESTINADO A DIMINUIR A PROBABILIDADE DE CONTRAIR UMA IST APÓS A EXPOSIÇÃO.

## TRATADA COM ANTIBIÓTICOS!

Deve aguardar 7 dias após o tratamento com dose única ou até ao final de um tratamento de 7 dias antes de retomar as relações sexuais.



*Para obter mais informações ou localizar um centro de testes próximo de si, visite:*

<https://gettested.cdc.gov/>

