


FENTANYL USE AND OVERDOSE PREVENTION




COMMON WAYS OF USING:

INJECTING



SNORTING



SMOKING



PILLS



YOU CANNOT OVERDOSE SIMPLY BY TOUCHING FENTANYL.



TEST IT.

**TESTING FOR THE PRESENCE
OF FENTANYL OR OTHER
CONTAMINENTS WILL HELP
BETTER DECIDE HOW MUCH TO
USE AND HOW.**



**TRY SMOKING &
SNORTING INSTEAD.**

**SHIFTING TO SNORTING
OR SMOKING MAY HELP
REDUCE RISK OF
OVERDOSE, BUT
OVERDOSES ARE STILL
POSSIBLE SO USE SLOW
AND SMALL DOSES .**



**ALWAYS CARRY
NALOXONE.**

**BE FAMILIAR WITH THE
SIGNS OF AN OVERDOSE
AND BE PREPARED TO
RESPOND WITH
NALOXONE.**




IF SOMEONE IS UNRESPONSIVE AND NOT BREATHING THEY ARE OVERDOSING AND YOU SHOULD:

	Administer a dose of naloxone & repeat every 2-3 minutes.		Perform rescue breathing. Give a rescue breath every 5 seconds.		Call for help. Dial 911 and tell them someone is unresponsive and not breathing.
---	---	---	---	---	--



Administer a dose of naloxone & repeat every 2-3 minutes.



Perform rescue breathing. Give a rescue breath every 5 seconds.




Call for help. Dial 911 and tell them someone is unresponsive and not breathing.



USO DE FENTANIL E PREVENÇÃO DE OVERDOSE



FORMAS COMUNS DE USO:



USO DE FENTANIL E PREVENÇÃO DE OVERDOSE


TESTE.

SABER O QUE HÁ NOS
DROGRAS PODE AJUDAR
NA DECISÃO DE QUANTO
E COMO MELHOR USÁ-
LOS.



EM VEZ DISSO, TENTE FUMAR E CHEIRAR.

MUDAR PARA CHEIRAR OU
FUMAR PODE AJUDAR A
REDUZIR O RISCO DE
OVERDOSE, MAS OVERDOSES
AINDA SÃO POSSÍVEIS, ENTÃO
USE DOSES PEQUENAS E
LENTAS.



LEVE SEMPRE NALOXONA.


FAMILIARIZE-SE COM OS
SINAIS DE UMA OVERDOSE
E ESTEJA PREPARADO
PARA RESPONDER COM
NALOXONA.



SE ALGUÉM NÃO RESPONDE E NÃO RESPIRA, ESTÁ A SOFRER UMA OVERDOSE E
VOCÊ DEVE:



Administre uma
dose de naloxona
e repita a cada 2
a 3 minutos.



Realize a respiração
boca a boca.
Administre uma
respiração boca a boca
a cada 5 segundos.



Peça assistência.
Ligue para o 192 e
informe que alguém
está inconsciente e
sem respirar.



PREVENCIÓN DE SOBREDOSIS Y DEL CONSUMO DE FENTANILO



FORMAS COMUNES DE USO:



PREVENCIÓN DE SOBREDOSIS Y DEL CONSUMO DE FENTANILO

HAZ UNA PRUEBA.

CONOCER EL CONTENIDO DE LA DROGRA PUEDE AYUDAR A DECIDIR QUÉ CANTIDAD CONSUMIR Y CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE UTILIZARLOS.



INTENTE FUMAR Y ASPIRAR EN SU LUGAR.

PUEDA QUE CAMBIAR A INHALAR O FUMAR AYUDE A REDUCIR EL RIESGO DE SOBREDOSIS, PERO LAS SOBREDOSIS SIGUEN SIENDO POSIBLES, POR LO QUE SE DEBEN UTILIZAR DOSIS LENTAS Y PEQUEÑAS.



LLEVE SIEMPRE NALOXONA.


FAMILIARÍCESE CON LOS SIGNOS DE UNA SOBREDOSIS Y ESTÉ PREPARADO PARA RESPONDER CON NALOXONA.



SI ALGUIEN NO RESPONDE Y NO RESPIRA, ESTÁ EXPERIMENTANDO UNA SOBREDOSIS Y USTED DEBE:



Administrar una dosis de naloxona y repetir cada 2 a 3 minutos.



Realice la respiración artificial. Administre una respiración artificial cada 5 segundos.



Solicita asistencia. Llama al 911 e informa que hay una persona inconsciente y sin respiración.

