


GONORRHEA

Gonorrhea is a sexually transmitted infection that can cause infection in the genitals, rectum, and throat. If untreated, gonorrhea can cause permanent damage like pelvic inflammatory disease that affect fallopian tubes and fertility.

SYMPTOMS:


If you have a Vagina:

- Burning sensation when peeing.
- Increased vaginal discharge
- Bleeding between periods.
- Belly pain and fever.




If you have a Penis:

- Burning sensation when peeing.
- Penis discharge, usually yellow, white or green.
- Swelling and/or pain of testicles.




Anal infection:

- Rectal pain or discharge
- Rectal bleeding
- Pain when pooping.
- Anal itching.



Throat infection:

- Sore throat.
- Redness and swelling.
- Sores in mouth or throat.




HAVE SYMPTOMS OR A POTENTIAL EXPOSURE? GET TESTED TODAY! YOUR PROVIDER MAY ASK YOU TO GIVE A URINE SAMPLE OR COLLECT SWABS DEPENDING ON TYPE OF SEXUAL EXPOSURE AND SYMPTOMS.




GONORRHEA

Gonorrhea is a sexually transmitted infection that can cause infection in the genitals, rectum, and throat. If untreated, gonorrhea can cause permanent damage like pelvic inflammatory disease that affect fallopian tubes and fertility.

PREVENTION TIPS!



USE A CONDOM EVERY TIME YOU HAVE SEX.



GET TESTED REGULARLY AND BETWEEN NEW PARTNERS. COMMUNICATE ABOUT TESTING STATUS WITH PARTNERS.



ASK YOUR DOCTOR ABOUT DOXYPEP! A PILL TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF GETTING A BACTERIAL STI POST EXPOSURE.

CURABLE WITH ANTIBIOTICS!

Treatment includes a single dose vaccine followed by a single dose of oral antibiotics or oral antibiotics for 7 days. You and your partner should retest after 3 months!



For more information or to find a testing location near you visit :

<https://gettested.cdc.gov/>




GONORREA

La gonorrea es una infección de transmisión sexual que puede provocar infecciones en los genitales, el recto y la garganta. Si no se trata, puede ocasionar daños permanentes, como la enfermedad inflamatoria pélvica, que afecta las trompas de Falopio y la fertilidad.

SÍNTOMAS:

Si posees vagina:

- Sensación de escozor al orinar.
- Aumento de la secreción vaginal
- Sangrado intermenstrual.
- Dolor abdominal y fiebre.




Si posees un pene:

- Sensación de escozor al orinar.
- Secreción del pene, generalmente de color amarillo, blanco o verde.
- Hinchazón y/o dolor en los testículos.




Infección anorrectal:

- Dolor o secreción anal
- sangrado rectal
- Dolor al evacuar.
- Picor anal.



Infección faríngea:

- Dolor de garganta.
- Eritema e inflamación.
- Llagas en la cavidad bucal o en la garganta.




¿PRESENTA SÍNTOMAS O HA ESTADO EXPUESTO? ¡REALÍCESE LA PRUEBA HOY MISMO! SU PROFESIONAL DE LA SALUD PODRÍA SOLICITARLE UNA MUESTRA DE ORINA O UN HISOPO, DEPENDIENDO DEL TIPO DE EXPOSICIÓN SEXUAL Y LOS SÍNTOMAS.




GONORREA

La gonorrea es una infección de transmisión sexual que puede provocar infecciones en los genitales, el recto y la garganta. Si no se trata, puede ocasionar daños permanentes, como la enfermedad inflamatoria pélvica, que afecta las trompas de Falopio y la fertilidad.

¡RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN!



UTILICE UN PRESERVATIVO EN CADA OCASIÓN QUE MANTENGA RELACIONES SEXUALES.



REALICE LA PRUEBA AL MENOS UNA VEZ AL AÑO Y MANTENGA COMUNICACIÓN CON SUS PAREJAS.



¡CONSULTE A SU MÉDICO ACERCA DE DOXYPEP! UN COMPRIMIDO DISEÑADO PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE CONTRAER UNA INFECCIÓN BACTERIANA TRAS LA EXPOSICIÓN.

¡SE TRATA CON ANTIBIÓTICOS!

El tratamiento consiste en una vacuna de dosis única, seguida de una única dosis de antibióticos orales o de un curso de antibióticos orales durante 7 días. ¡Usted y su pareja deberían realizarse nuevamente la prueba después de 3 meses!



Para obtener más información o localizar un centro de pruebas cercano, visite:

<https://gettested.cdc.gov/>




GONORREIA

A gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível que pode provocar infecções nos genitais, reto e garganta. Se não for tratada, pode resultar em danos permanentes, como a doença inflamatória pélvica, que afeta as trompas de Falópio e a fertilidade.

SINTOMAS:


Se possui uma vagina:

- Sensação de ardor ao urinar.
- Aumento do fluxo vaginal
- Sangramento intermenstrual.
- Dor abdominal e febre.




Se possui um pênis:

- Sensação de ardor ao urinar.
- Secreção peniana, tipicamente amarela, branca ou verde.
- Inchaço e/ou dor nos testículos.




Infecção anal:

- Dor ou secreção anal
- Sangramento retal.
- Dor ao evacuar.
- Coceira anal.



Infecção da garganta:

- Dor de garganta.
- Eritema e edema.
- Feridas na cavidade oral ou na faringe.




APRESENTA SINTOMAS OU UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO? REALIZE O TESTE AINDA HOJE! O SEU MÉDICO PODE SOLICITAR UMA AMOSTRA DE URINA OU A RECOLHA DE AMOSTRAS, CONSOANTE O TIPO DE EXPOSIÇÃO SEXUAL E OS SINTOMAS.




GONORRÉIA

A gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível que pode provocar infecções nos genitais, reto e garganta. Se não for tratada, pode resultar em danos permanentes, como a doença inflamatória pélvica, que afeta as trompas de Falópio e a fertilidade.

DICAS DE PREVENÇÃO.



UTILIZE SEMPRE PRESERVATIVO DURANTE A RELAÇÃO SEXUAL.



REALIZE O TESTE PELO MENOS UMA VEZ POR ANO E MANTENHA COMUNICAÇÃO COM OS PARCEIROS.



CONSULTE O SEU MÉDICO SOBRE A DOXIPEP! UM COMPRIMIDO DESTINADO A DIMINUIR A PROBABILIDADE DE CONTRAIR UMA IST APÓS A EXPOSIÇÃO.

TRATADA COM ANTIBIÓTICOS!

O tratamento consiste numa vacina de dose única, seguida de uma dose única de antibióticos orais ou de antibióticos orais durante 7 dias. Você e o seu parceiro devem realizar o teste novamente após 3 meses!



Para obter mais informações ou localizar um centro de testes próximo de si, visite:

<https://gettested.cdc.gov/>

