


SYPHILIS

Syphilis is a sexually transmitted infection (STI) that can be transmitted by having vaginal, anal, or oral sex. Syphilis can also be transmitted from mother to baby during pregnancy. Syphilis manifest in 4 different stages and can also develop into Neurosyphilis at any point.

STAGES OF SYPHILIS & SYMPTOMS:



- Severe headaches
- Muscle weakness
- Altered mental state
- Eye pain or redness
- Vision changes
- Blindness
- Hearing loss
- Ringing/buzzing in ears
- Dizziness or Vertigo


HAVE SYMPTOMS OR A POTENTIAL EXPOSURE? GET TESTED TODAY! YOUR PROVIDER MAY ASK TO RUN SOME BLOOD TEST AND EVALUATE SYMPTOMS.




SYPHILIS

Syphilis is a sexually transmitted infection (STI) that can be transmitted by having vaginal, anal, or oral sex. Syphilis can also be transmitted from mother to baby during pregnancy. Syphilis manifest in 4 different stages and can also develop into Neurosyphilis at any point.

PREVENTION TIPS!



USE A CONDOM EVERY TIME YOU HAVE SEX.



GET TESTED REGULARLY AND BETWEEN NEW PARTNERS. COMMUNICATE ABOUT TESTING STATUS WITH PARTNERS.



ASK YOUR DOCTOR ABOUT DOXYPEP! A PILL TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF GETTING A STI POST EXPOSURE.

CURABLE WITH ANTIBIOTICS!

After assessing what stage you are, your provider will determine best course of treatment. Treatment usually is a course of injection antibiotics.



For more information or to find a testing location near you visit :

<https://gettested.cdc.gov/>


Adapted from the CDC website: <https://www.cdc.gov/syphilis>



SÍFILIS

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) que puede propagarse a través de relaciones sexuales vaginales, anales u orales. Además, puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo. Se presenta en cuatro etapas distintas y puede progresar a neurosífilis en cualquier momento.

ETAPAS DE LA SÍFILIS Y SUS SÍNTOMAS:



En cualquier fase, la sífilis puede progresar a neurosífilis, lo que puede impactar el cerebro, el sistema nervioso, los ojos y los oídos. Los síntomas pueden abarcar:

- Cefaleas intensas
- debilidad muscular
- Estado mental modificado
- Dolor/enrojecimiento de los ojos
- Ceguera
- Pérdida de audición
- Tinnitus en los oídos
- Mareos o sensación de vértigo

¿PRESENTA SÍNTOMAS O HA ESTADO EXPUESTO? ¡REALÍCESE LA PRUEBA HOY MISMO! SU MÉDICO PODRÍA RECOMENDARLE UN ANÁLISIS DE SANGRE PARA EVALUAR LOS SÍNTOMAS.


Adaptado del sitio web de los CDC: <https://www.cdc.gov/sifilis>




SÍFILIS

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) que puede propagarse a través de relaciones sexuales vaginales, anales u orales. Además, puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo. Se presenta en cuatro etapas distintas y puede progresar a neurosífilis en cualquier momento.

¡RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN!



UTILICE UN PRESERVATIVO EN CADA OCASIÓN QUE MANTENGA RELACIONES SEXUALES.



REALICE LA PRUEBA AL MENOS UNA VEZ AL AÑO Y MANTENGA COMUNICACIÓN CON SUS PAREJAS.



¡CONSULTE A SU MÉDICO ACERCA DE DOXYPEP! UN MEDICAMENTO DISEÑADO PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE CONTRAER UNA ETS TRAS LA EXPOSICIÓN.

¡SE TRATA CON ANTIBIÓTICOS!

Tras evaluar en qué fase se encuentra, su proveedor determinará el tratamiento más adecuado. El tratamiento generalmente consiste en una serie de inyecciones de antibióticos.



Para obtener más información o localizar un centro de pruebas cercano, visite:


<https://gettested.cdc.gov/>



SÍFILIS

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) que pode ser transmitida através de relações sexuais vaginais, anais ou orais. Além disso, a sífilis pode ser transmitida da mãe para o bebê durante a gravidez. Esta infecção apresenta-se em quatro estágios distintos e pode evoluir para neurosífilis a qualquer momento.

ESTÁGIOS DA SÍFILIS E SINTOMAS:



Em qualquer fase, a sífilis pode progredir para neurosífilis, que pode afetar o cérebro, o sistema nervoso, os olhos e os ouvidos. Os sintomas podem incluir:

- Cefaleias intensas
- Fraqueza muscular
- Estado mental modificado
- Dor ou rubor ocular
- Alterações na visão
- Cegueira
- Perda auditiva
- Zumbido nos ouvidos
- Tontura ou vertigem.

APRESENTA SINTOMAS OU UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO? REALIZE O TESTE AINDA HOJE! O SEU MÉDICO PODE SOLICITAR UM EXAME DE SANGUE PARA AVALIAR OS SINTOMAS.


Adaptado do site do CDC: <https://www.cdc.gov/sifilis>




SÍFILIS

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) que pode ser transmitida através de relações sexuais vaginais, anais ou orais. Além disso, a sífilis pode ser transmitida da mãe para o bebê durante a gravidez. Esta infecção apresenta-se em quatro estágios distintos e pode evoluir para neurosífilis a qualquer momento.

DICAS DE PREVENÇÃO.



UTILIZE SEMPRE PRESERVATIVO DURANTE A RELAÇÃO SEXUAL.



REALIZE O TESTE PELO MENOS UMA VEZ POR ANO E MANTENHA COMUNICAÇÃO COM OS PARCEIROS.



CONSULTE O SEU MÉDICO SOBRE A DOXIEP! UM COMPRIMIDO DESTINADO A DIMINUIR A PROBABILIDADE DE CONTRAIR UMA IST APÓS A EXPOSIÇÃO.

TRATÁVEL COM ANTIBIÓTICOS!

Após avaliar em que estágio se encontra, o seu médico determinará o melhor plano de tratamento. O tratamento é geralmente realizado com antibióticos injetáveis.



Para obter mais informações ou localizar um centro de testes próximo de si, visite:

<https://gettested.cdc.gov/>

